

Hur stora grupper man brukar hålla tillväxtgrisar, slaktgrisar, suggor och gyltor? Vilka inhysningssystem som är vanligast inom Svensk grisproduktion?

Det dominerande systemet för gruppållning av tillväxtgrisar och slaktsvin i Sverige är för grupper motsvarande normal kullstorlek, vilket i praktiken innebär 10 grisar +/- 2 st per grupp.

Hur suggor och gyltor hålls beror på i vilket stadium de är i sin livscykel. En grisande och diande sugga är alltid ensam i sin box. En sinsugga hålls i större grupper från ca 10-40 st, beroende på inhysningssystem. Gyltor hålls ofta i grupper motsvarande slaktsvin i antal, under könsnognad och inför sin första brunst.

Vad det gäller inhysningssystem så finns det ingen officiell statistik men erfarenhetsmässigt kan man säga att det vanligaste är att slaktsvin och tillväxtgrisar hålls i boxar med ströat betonggolv som ät-och liggyta samt gödselyta på spalt. Det förekommer även att tillväxtgrisar hålls i större grupper (100 -200 st i storboxar på djupströ) men det är ett system på utgående som hade sin "topp" under 80- och 90-talet.

Sinsuggor/gyltor hålls både i boxar med ströat betonggolv och på djupströbädd. I takt med att besättningarna blir allt större väljer man av praktiska halmhanteringskäl inför en nybyggnation, att låta suggorna gå på djupströ under brunst- och semineringsperiod för att sedan flyttas över till "halmfattigare" system.

Ingvar Eriksson

December 2011