

## Ta hand om gyltan

Gyltorna är besättningens framtid och ska födas upp till hållbara suggor. Mycket av det som sker under gyltans uppfödning påverkar hennes liv som sugga. Därför ska du skapa förutsättningar för mer hållbara suggor.

### Karantän

Alla inköpta djur ska vistas i karantän under minst 3 veckor, gärna längre. Karantänen ska vara väl avskild från övriga besättningen och skötas separat. Följ Svenska Djurhälsovårdens behandlings- och vaccinationsprogram.

### Inhysning

- Djupströbädd runt betäckning och under dräktigheten är att föredra, eftersom det ger bra förutsättningar för god ben- och klövhälsa.
- Stora ytor är bra för att gyltor ska kunna stärka ben och muskler.
- Minst 2 m<sup>2</sup> per gylta rekommenderas.

*OBS! Svenska djurskyddsföreskrifter är bara minimimått.*

### Socialisering

Att gyltan är trygg i umgänget med stallpersonalen är viktigt i samband med brunstkontroll, betäckning och inte minst i samband med grisning. Vänj därför gyltorna vid daglig kontakt med människor.

## Utfodring

- Utfodra med ett suggfoder med 0,57-0,73 g smb lys/MJ NE (0,43-0,55 g smb lys/MJ OE), använd inte slaktgrisfoder.
- Utfodra ca 90 % av slaktgrisonorm.
- Öka vid behov fodergivan efter 90-100 kg för att få önskat hull vid betäckning.
- Flushing ger fler levande födda smågrisar, höj fodergivan till ca 31 MJ NE (42 MJ OE) i 5-10 dagar före betäckning.
- Sänk fodergivan direkt efter betäckning till dräktighetsgiva de närmaste dagarna.
- Under dräktighet utfodras med suggfoder. Fodergivan anpassas efter hull.

Vikt (kg)	Fodergiva (MJ NE/dag)	Fodergiva (MJ OE/dag)
30	14-15	18-19
60	22-23	29-31
90-100, efter hull	22-25	29-33
Dräktighet, efter hull	22-27	30-36

## Brunstkontroll och betäckning

Påbörja brunstkontrollen redan innan gyltorna flyttas till betäckningsavdelningen. Tillämpa gärna ett ljusprogram med ljusstyrkan 200-300 lux i 16 timmar och därefter släckt. Betäck tidigast på 2:a till 3:e brunst när gyltorna har uppnått följande:

- 220-240 dagars ålder.
- Målvikt 140 kg.
- Vid grisning ska gyltan ha 16-18 mm sidspäck. Vid betäckning kan 12-13 mm räcka under förutsättning att gyltorna extrautfodras så att de når önskvärt hull vid grisning.

Följ upp gyltornas hullutveckling med hullbedömning och ekolodning.