

Hur mycket torrfoder ska diande grisar äta för att man ska kunna sluta ge dem järntillskott tex mull?

Smågrisarna kan ges fodertillskott från 2 veckors ålder för att deras matsmältningssystem ska anpassas sig till annan föda än mjölk. Fodrets sammansättning är mindre viktig och det är därför enklast att ge samma foder som grisarna ska äta efter avvänjning. Om suggan inte har tillräckligt med mjölk eller spenarna inte räcker till ska speciellt fodertillskott ges direkt och det fodret baseras på mjölkprodukter, fett, lågantigena proteinfodermedel (fiskmjöl, potatisprotein, sojaproteinkoncentrat etc.) och hydrolyserad (kokt) spannmål.

Fodertillskottet som ges från 2 veckors ålder kan ges både blött och torrt. Tillskottet bör kompletteras med torv (eller annan järnkälla) för att stimulera grisarnas intag. Då grisarna bara äter sammanlagt 0,5 kg foder fram till avvänjning är det viktigt att de får extra tillskott av järn för att klara sig. Det finns inte tillräckligt med järn i fodret och de inte får i sig tillräckliga mängder foder för att nå sitt järnbehov. Gångse rekommendation är därför att alltid ge järntillskott tex mull för att försäkra sig om att smågrisarna får den mängd järn de behöver.

För besättnings specifika åtgärder kring järntillskott för smågrisar, kontakta din djurhälsöveterinär.

Referenser

Utfodring av smågrisar (upp till 30 kg levande vikt). 2009. Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård. Hitta rapporten: <http://svenskapig.se/fakta-3/foder-1/utfodring>