

## Passa grisningar med koncentration och närvaro

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:

### Stallmiljö och hygien

Smågrisen föds utan skydd mot bakterier som finns i stallmiljön. En god hygien ökar förutsättningarna för en bra start i smågrisens liv. Gör följande innan en ny grisningsomgång:

- Rengör stallet mekaniskt och tvätta fritt från gödselrester med högtryckstvätt. Rengör blötfoderanläggning, inkl. rör och ledningar. Låt stallet torka innan suggor sätts in, använd tillskottsvärme. Desinficera stallet om tomtiden är kort och förläng tomtiden om problem föreligger.
- Rengör ventilationsanläggningen enligt tillverkarens rekommendationer.
- Töm och rengör torrfoderautomater, justera fodergivan, rengör foderhoar.
- Kontrollkör ventilationen för minimi- och maximiventilation.
- Töm vattenrör på stående vatten och kontrollera att vattenniappar/vattenkoppar fungerar.

### Hälsokontroll

När suggorna flyttas till grisningsavdelningen, ca 1 vecka före grisning, ska de hälsokontrolleras. Notera avvikande suggor och håll koll på dessa. Följ upp resultaten efter grisning.

Var uppmärksam på	Åtgärdsförslag
Magra eller feta suggor	Anpassa utfodringen individuellt och efter hull.
Sårskador, bölder, svullnad, rodnad	Behandla skadade spenar enligt veterinärs rekommendation. Anpassa antalet smågrisar efter antal fungerade juverdelar.
Långa klövar, skador, sår	Verka suggor med långa klövar, behandla skador enligt veterinärs anvisningar.
Felställning, skador, hältor	För anteckningar över suggor som avviker och följ upp dem.

### Övervakning av grisningen

Förbered inför grisningen genom att strö halm till suggan och i smågrishörnan. Tänd smågrislamporna, så att smågrisarna inte riskerar att bli nedkylda. Se till att övervaka grisningen för att kunna sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Normalt föds en gris var 15:e minut och grisningen är avslutad inom tre till fyra timmar. Kontrollera följande punkter under övervakningen:



Var uppmärksam på	Åtgärdsförslag
Långa tidsintervall mellan födda grisar	Massage av juvret frisätter oxytocin som driver värkarbetet. Syntetiskt oxytocin kan ev ges enligt veterinärs anvisningar. Om det är mer än 15-30 min sedan senast födda gris, kontrollera att förlossningsvägen är tom. Kontrollera att efterbörden kommer ut och ser normal ut.
Orolighet, reser sig ofta, aggressiv, slö	Skydda smågrisarna från att skadas. Ge råmjölk från annan sugga om grisarna inte får dia. Vänj gyttor vid hantering tidigt.

